

# Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗青少年/成人及兒童劑型比較

品項

成人劑型  
(適用:滿12歲以上)

兒童劑型  
(適用:滿5歲至11歲)

外觀比較

① 紫色上蓋

③ COVID-19 mRNA Vaccine

④ 6 doses after dilution (30 mcg/dose)

稀釋前 稀釋後

② 原液約0.45 ml

① 橘色上蓋

③ COMIRNATY™



④ 10 doses of 10 mcg after dilution

稀釋前 稀釋後

② 原液約1.3 ml



包裝：49瓶/盒



包裝：10瓶/盒

# Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗青少年/成人及兒童劑型比較

| 品項  | 成人劑型<br>(適用:滿12歲以上)   | 兒童劑型<br>(適用:滿5歲至11歲)  |
|-----|---|---|
| 稀釋液 | 原液0.45 ml<br>+1.8 ml<br>0.9%無菌生理食鹽水注射液  | 原液1.3 ml<br>+1.3 ml<br>0.9%無菌生理食鹽水注射液   |
| 劑量  | <ul style="list-style-type: none"> <li>稀釋後 6 doses/vial</li> <li>每劑抽取 0.3 ml ; 每劑疫苗含量 30 mcg</li> <li>抽取疫苗至不足0.3 ml完整劑量，應丟棄該藥瓶與剩餘劑量。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>稀釋後 10 doses/vial</li> <li>每劑抽取 0.2 ml ; 每劑疫苗含量 10 mcg</li> <li>抽取疫苗至不足0.2 ml完整劑量，應丟棄該藥瓶與剩餘劑量</li> </ul> |
| 對象  | <ul style="list-style-type: none"> <li>滿12歲以上</li> <li>➤ 基礎劑第1、2劑</li> <li>➤ 基礎加強劑</li> <li>➤ 追加劑</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>滿5歲至11歲</li> <li>➤ 基礎劑第1、2劑</li> </ul>   |

成人劑型 兒童劑型



# 兒童及青少年(5歲至17歲)接種作業COVID-19疫苗

| 疫苗種類    | Moderna COVID-19疫苗   |  | Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗<br>兒童劑型  | Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗<br>成人劑型   |
|---------|--|--|---|--|
| 對象*     | 滿6歲以上  |  | 滿5歲至11歲   | 滿12歲以上   |
| 劑量      | <ul style="list-style-type: none"> <li>滿6-11歲：0.25 ml/劑(50 mcg)</li> <li>滿12歲以上：0.5 ml/劑(100 mcg)</li> </ul> |  | 0.9%無菌生理食鹽水注射液<br>使用1.3 ml 進行稀釋   | 0.9%無菌生理食鹽水注射液<br>使用1.8 ml進行稀釋   |
|         |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>稀釋後每劑抽取 0.2 ml</li> <li>每劑疫苗含量 10 mcg</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>稀釋後每劑抽取 0.3 ml</li> <li>每劑疫苗含量 30 mcg</li> </ul>  |
| 適用接種劑次  | <ul style="list-style-type: none"> <li>滿6歲-11歲</li> <li>➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週)</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>滿12歲至17歲</li> <li>➤ 基礎劑1、2劑(間隔12週)</li> <li>➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>滿5歲至11歲</li> <li>➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週)</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>滿12歲至17歲</li> <li>➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週)</li> <li>➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天)</li> <li>➤ 追加劑(與前一劑次間隔至少5個月(150天))</li> </ul> |
| (年齡範例*) | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 105年(含)以前出生</li> <li>111年5月25日接種，須為105年5月25日(含)以前出生</li> </ul>      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 106年(含)以前出生</li> <li>111年5月25日接種，須為106年5月25日(含)以前出生</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 99年(含)以前出生</li> <li>111年5月25日接種，須為99年5月25日(含)以前出生</li> </ul>  |

\*註：核對出生年月日足歲